

คำวินิจฉัย (พืตวา) จุฬาราชมนตรี ที่ 17/2557



เรื่อง กรณีของผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องรับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง และผู้ป่วยโรคเบาหวาน

คำถาม : กรณีของผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องรับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง (HIV positive and AIDS) ทุกๆ 12 ชั่วโมง จำเป็นจะต้องถือศีลอดหรือไม่? และกรณีของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอันตรายต่อร่างกาย จำเป็นจะต้องถือศีลอดหรือไม่?

คำวินิจฉัย

: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين ... وبعد

ผู้ป่วยเอดส์ที่มีความจำเป็นต้องทำการรักษาด้วยการรับประทานยาในช่วงกลางวันของการถือศีลอด โดยรับประทานยาทุก 12 ชั่วโมง ถือเป็นผู้ป่วยเรื้อรังไม่หวังหายซึ่งมีข้อผ่อนผันให้สามารถงดการถือศีลอดได้ และให้จ่ายฟิดยะฮ์แทนตามจำนวนวันที่งดการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนนั้นๆ วันละ 1 มุคด์ (ประมาณ 600 กรัม) จากอาหารหลักของผู้คนในท้องถิ่นที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่⁽¹⁾

สำหรับกรณีของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและมีอาการอ่อนเพลีย หรือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำมากและมีอาการอ่อนเพลีย หากเกิดภาวะความเสี่ยงสูงดังกล่าว ก็จำเป็นต้องงดการถือศีลอดและให้ชดใช้การถือศีลอดในภายหลัง ช่วงที่น้ำตาลของผู้ป่วยอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้โดยไม่ต้องจ่ายฟิดยะฮ์ ซึ่งภาวะความเสี่ยงดังกล่าวต้องได้รับการวินิจฉัยและการแนะนำของแพทย์ที่ชำนาญการและมีความน่าเชื่อถือ แต่ถ้าหากภาวะความเสี่ยงนั้นดำรงอยู่ยาวนาน และไม่คาดว่าจะหายได้ ผู้ป่วยก็สามารถงดการถือศีลอดและจ่ายฟิดยะฮ์แทนได้ ดังกรณีของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่กล่าวมาข้างต้น

والله اعلم بالصواب

อาซิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี

(1) อัล-ฟิคุลฮฺอิสลามียะฮ์ ว่า อะดิลละตุฮฺ: ดร.วะฮ์บะฮ์ อัซ-ซุฮัยลียะฮ์ : 2/644, 688, อัลฟิคุลฮฺมันชะญียะฮ์ : 2/93, 94